

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/7/20 11:04

プロトコール名称 サイラムザ+パクリタキセル

同一グループ サイラムザ+パクリタキセル

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ネオレスタール注射液10mg 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて サイラムザ点滴静注用 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 8 mg/kg 1 袋		10:20						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて テルモ生食 100ml	キープ側管から div 3回目以降は15分で投与可 1 袋		11:20						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 80 mg/m ² 1 袋		12:20						
続き有り										

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/7/20 11:04

プロトコール名称 サイラムザ+パクリタキセル

同一グループ サイラムザ+パクリタキセル

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ μ l	以下	リンパ球	%
好中球	個/ μ l	以下	血小板	個/ μ l
				以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ネオレスタール注射液10mg 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:15						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 80 mg/m ² 1 袋		10:20						
続き有り										

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/7/20 11:04

プロトコール名称 サイラムザ+パクリタキセル

同一グループ サイラムザ+パクリタキセル

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ネオレスタール注射液10mg 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて サイラムザ点滴静注用 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 8 mg/kg 1 袋		10:20						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて テルモ生食 100ml	キープ側管から div 3回目以降は15分で投与可 1 袋		11:20						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 80 mg/m ² 1 袋		12:20						
		—以下余白—								

コメント

参考文献