

# プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコール名称 APL地固め第3コース IDR+Ara-C

同一グループ APL地固め第3コース IDR+Ara-C

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	6日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	8日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
処方 (前投薬)	院内								
Rp 01	イメンドカプセル125mg .. 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝					
処方	院内								
Rp 01	イメンドカプセル80mg .. 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝			
注射									
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
Rp 02	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
注射									
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて イダマイシン静注用5mg 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 12 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 袋		10:05	10:05	10:05			
		続き有り							

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコル名称 APL地固め第3コース IDR+Ara-C

同一グループ APL地固め第3コース IDR+Ara-C

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	6日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	8日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) キロサイド 大塚糖液 5% 500ml	キープ側管から 46.6666mg/m <sup>2</sup> 1 袋	div	10:35	10:35	10:35	10:05	10:05	
Rp 05	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液 0.3mg 2ml 大塚生食注 20ml	キープ側管から 1 A 1 A	iv	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		18:05	18:05	18:05	18:05	18:05	
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) キロサイド 大塚糖液 5% 500ml	キープ側管から 46.6666mg/m <sup>2</sup> 1 袋	div	18:05	18:05	18:05	18:05	18:05	
注射									
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			02:00	02:00	02:00	02:00	02:00
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) キロサイド 大塚糖液 5% 500ml	キープ側管から 46.6666mg/m <sup>2</sup> 1 袋	div		02:00	02:00	02:00	02:00	02:00
-以下余白-									

コメント

参考文献