

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコール名称 FLAG-MG (Day1はG-CSF、抗がん剤はDay2～)

同一グループ

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	9日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	19日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2013/ 9/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0～25 mL/min	%	GFR 0～25 mL/min	%	
CCr 25～50 mL/min	%	GFR 25～50 mL/min	%	
CCr 50～75 mL/min	%	GFR 50～75 mL/min	%	
CCr 75～100 mL/min	%	GFR 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	その他 イメンドカプセル125mg	化学療法用前投薬 1 C			09:30					
Rp 02	その他 医師の指示どおりに イメンドカプセル125mg	化学療法用前投薬 1 C				08:30	08:30	08:30	08:30	
Rp 03	皮下注射 グランシリンジ150 0.6ml	皮下 1 筒		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
Rp 05	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 生食「CMX」20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A			10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて フルダラ静注用50mg 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 30 mg/m ² 1 A 1 袋			10:05	10:05	10:05	10:05	10:05	
続き有り										

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコル名称 FLAG-MG (Day1はG-CSF、抗がん剤はDay2～)

同一グループ

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	9日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	19日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2013/ 9/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて キロサイド 生理食塩液バックAL「フー」 500ml	キープ側管から RP6の終了後3.5時間後から開始 1000 mg/m ² 1 袋	div		14:05	14:05	14:05	14:05	14:05	
注射										
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ノバントロン注10mg 5ml テルモ生食 100ml	キープ側管から 5 mg/m ² 1 袋	div		17:05	17:05	17:05			
注射										
Rp 09	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 生食「CMX」20ml	キープ側管から 1 A 1 A	iv		18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコール名称 FLAG-MG (Day1はG-CSF、抗がん剤はDay2～)

同一グループ

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	9日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	19日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2013/ 9/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0～25 mL/min	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 mL/min	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 mL/min	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 mL/min	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN	mg/dL	Scr	mg/dL
	以上		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST	U/L	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL		以上
	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球	個/ μ l	リンパ球	%
好中球	個/ μ l	血小板	個/ μ l
	以下		以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)					
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			10:00					
Rp 10	静脈内注射 (化学療法投与ルート) !!ソル・ド・ロム静注用125mg (溶解液付) 生食「CMX」20ml	キープ側管から 1 1 1 A	i v		10:00					
Rp 11	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml ネオレスタール注射液10mg 生食「CMX」20ml	キープ側管から 1 A 1 A 1 A	i v		10:05					
Rp 12	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて 生理食塩液バックAL「フー」500ml	点滴 (DIV) 1 袋			10:10					
Rp 13	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて PVCフリーフィルター使用 マイロターゲット点滴静注用5mg 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から 《遮光保存》 3 mg/m ² 1 A 1 袋	d i v		11:40					
		—以下余白—								

コメント

参考文献