

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコール名称 Ph-ALL202地固め第1・4コース

同一グループ Ph-ALL202地固め第1・4コース

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| 疾患名 | 白血病・MDS | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 4日 | 承認者 | 岡崎 一真 |
| 休薬日数 | 10日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 岡崎 一真 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日 | |

| | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % |

| | | | |
|----------------|----|-----------|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 |

| | | | |
|----------------|----|---------|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | 以上 |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | |

| | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | |
| 白血球 個/ μ l | 以下 | リンパ球 /% | 以下 |
| 好中球 個/ μ l | 以下 | 血小板 個/ μ l | 以下 |

.....
 日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | | | |
|-------|--|--|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Rp 01 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml | ルートキープ 1 袋 | | 09:30 | 09:30 | 09:30 | | | | |
| Rp 02 | 静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 大塚生食注 20ml | キープ側管から iv 1 A 1 A | | 09:30 | 09:30 | 09:30 | | | | |
| Rp 03 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml テルモ生食 100ml 投与開始後、薬局に連絡してください。 | キープ側管から div 10 A 1 袋 | | 09:35 | 09:35 | 09:35 | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて ラステット注100mg 5ml 大塚生食注 250ml | キープ側管から div 使用期限 : まで 100 mg/m ² 1 袋 | | 10:35 | 10:35 | 10:35 | | | | |
| Rp 05 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて キロサイド 生理食塩液バックAL「フー」 500ml | キープ側管から div 2000 mg/m ² 1 袋 | | 11:35 | 11:35 | 11:35 | | | | |
| | | | 続き有り | | | | | | | |

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 Ph-ALL202地固め第1・4コース

同一グループ Ph-ALL202地固め第1・4コース

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| 疾患名 | 白血病・MDS | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 4日 | 承認者 | 岡崎 一真 |
| 休薬日数 | 10日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 岡崎 一真 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日 | |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 | |

| | | | | |
|----------------|----|---------|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | 以上 | |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | |

| | | | | |
|----------------|----|----------------|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | |
| 白血球 個/ μ l | 以下 | リンパ球 /% | 以下 | |
| 好中球 個/ μ l | 以下 | 血小板 個/ μ l | 以下 | |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | | | |
|--------|--|--|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Rp 06 | 脳脊髄腔 医師の指示どおりに 注射用メソトレキセート (LD) !!デキサト注射液3. 3mg 1ml 大塚生食注 20ml 1回 5ml使用 | 脳脊髄腔 (腰椎) 15 mg/Body 1 A 1 A | | 14:00 | | | | | | |
| Rp 07 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 4時間かけて ビーフリード輸液 500ml | 点滴 (DIV) 1 缶 | | 14:35 | 14:35 | 14:35 | | | | |
| Rp 08 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 5時間かけて ビーフリード輸液 500ml | 点滴 (DIV) 1 缶 | | 18:35 | 18:35 | 18:35 | | | | |
| Rp 09 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml | ルートキープ 1 袋 | | 23:30 | 23:30 | 23:30 | | | | |
| Rp 10 | 静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0. 3mg 2ml 大塚生食注 20ml | キープ側管から i v 1 A 1 A | | 23:30 | 23:30 | 23:30 | | | | |
| Rp 11 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて キロサイド 生理食塩液パックAL「70」 500ml | キープ側管から d i v 2000 mg/m ² 1 袋 | | 23:35 | 23:35 | 23:35 | | | | |
| -以下余白- | | | | | | | | | | |

コメント

参考文献