

プロトコルマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/8/2

16:10

プロトコル名称 Ph+ALL208地固めC2

同一グループ Ph+ALL208地固めC2

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方	院内									
Rp 01	プレドニン錠 5mg 60mg/m ² ... 1日2回 朝・昼食後	20 錠		朝 昼	朝 昼	朝 昼	朝 昼	朝 昼	朝 昼	朝 昼
Rp 02	グリベック錠 100mg 0.000m ² ~ 9999.999m ² 6錠 ... 1日1回 朝食後				朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 24時間持続 テルモ生食 1L メイロン静注7% 250ml	点滴 (DIV) 2 袋 1 袋		09:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 瓶 1 袋		10:00						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	キープ側管から div 1 袋		10:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 Ph+ALL208地固めC2

同一グループ Ph+ALL208地固めC2

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ μ l	以下	リンパ球	%
好中球	個/ μ l	以下	血小板	個/ μ l
				以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて 注射用エンドキサン 大塚蒸留水 500ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液「バックAL「フソ」」 500ml	キープ側管から 1200 mg/m ² 1 瓶	d i v	11:00						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて ダウノマイシン静注用 20mg 生理食塩液PL「フソ」 50ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から 60 mg/m ² 1 瓶	d i v	14:00						
Rp 07	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて オンコピン注射用 1mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】	キープ側管から 1.3 mg/m ² 2 A	i v	15:00						
Rp 08	脳脊髄腔 Total 5mlとする 注射用メソトレキセート (LD) キロサイド !!デキサート注射液 3.3mg 1ml 大塚生食注 20ml	脳脊髄腔 (腰椎) 15 mg/Body 40 mg/Body 1 A 1 A		11:00						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/8/2

16:10

プロトコル名称 Ph+ALL208地固めC2

同一グループ Ph+ALL208地固めC2

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	個/ μ l	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 02	グリバック錠 100mg 0.000m ² ~ 9999.999m ² 6錠 . . 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/8/2

16:10

プロトコル名称 Ph+ALL208地固めC2

同一グループ Ph+ALL208地固めC2

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
------	-------------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 02	グリベック錠 100mg			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	0.000m ² ~ 9999.999m ² 6錠									
	.. 1日1回 朝食後									

-以下余白-

コメント

参考文献